
Camponotus maculatus

Camponotus maculatus ist polymorph. Es werden ähnliche Biotope besiedelt wie Cataglyphis viaticus.

Bei volkreicher Kolonie und günstigen Bedingungen ziemlich aggressiv.







Artenverzeichnis

Familie	Formicidae (Ameisen)
Unterfamilie	Formicinae (Schuppenameisen)
Tribus	Camponini
Gattung	Camponotus
Untergattung	Camponotus maculatus
Art	Tanaemyrmex
Lebensraum/Heimat	West- bis Ostafrika, bevorzugt Steppe und Trockenwald,

Königinnen	monogyn, claustral
Arbeiterinnenunterkasten	stark polymorph Minor, Media und Major-Arbeiterinnen
Nahrung	Insekten, Honigtau
Winterruhe	Diapause Juni/Juli
Schwärmzeit	Ende März bis Anfang April
Aussehen/Färbung	Königinnen: Kopf dunkelbraun bis schwarz, Gaster mattschwarz, Unterseite glänzend schwarz; Arbeiterinnen: Kopf bei größeren Arbeiterinnen dunkelbraun bis schwarz, bei kleineren rötlich; Thorax hell bernsteinfarben bis rötlich, Gaster mattschwarz, Unterseite glänzend schwarz
Puppen	Kokonpuppen
Körpergröße	Königinnen: 18-19mm Arbeiterinnen: 6-14mm
Koloniegröße	mehrere 10.000 Individuen
Luftfeuchtigkeit Arena/Nest	Arena: 30 - 50% Nestbereich: 50 - 60%
Temperatur Arena/Nest	Arena: 18 - 30°C Nestbereich: 24- 28°C
Bodengrund Arena	Farm: Sand-Lehm Arena: Sand, Sand-Lehm
Nestformen	Erdnester, oft unter Steinen
Entwicklungszeiten	Vom Ei bis zur Arbeiterin,11 Wochen
Einschätzung der Haltungsschwierigkeit	Schwierig zum halten da die Temperatur eine wichtige Rolle spielt