

Myrmica schencki

Jede offene, ausreichend besonnte Stelle mit niedriger Bodenvegetation kann von *Myrmica schencki* besiedelt werden. Sie kommt z.B. auch in trockenrasenähnlichen, stadtnahen Lebensräumen vor. Die Nestgröße bewegt sich meist zwischen 300 und 500 Tieren, höchstens aber 1000 mit 1-5 Königinnen. Diese Art ist wenig aggressiv, gegenüber anderen Ameisenarten aber sehr wehrhaft (auch gegenüber größeren Arten). Baut typischerweise Erdnester unter einer Moosschicht, aber auch unter Steinen.

-

Artenverzeichnis	
Familie	Formicidae (Ameisen)
Unterfamilie	Myrmicinae (Knotenameisen)
Tribus	Myrmicini
Gattung	Myrmica
Art	Myrmica schencki
Lebensraum/Heimat	Ganz Europa, Asien; auch Nordamerika
Königinnen	semiclaustral, polygyn
Arbeiterinnenunterkasten	Nein, monomorph
Nahrung	Hauptsächlich zoophag, aber auch nektarivor
Winterruhe	Ja
Schwärmzeit	Ende Juli - Ende August
Aussehen/Färbung	Königinnen, Arbeiterinnen: Kopfvorderfläche und Gaster dunkelbraun; Thorax und Stielchenknoten rotbraun; Mandibeln , Fühler und Beine hellbraun bis rötlichbraun; Kopf runzelig längsgestreift; ziemlich lange, abstehende Borsten; Männchen: glänzend schwarzbraun; Fühlerkeule, Femora , Tibien und Tarsen gelblich braun;
Puppen	Keine Angabe
Körpergröße	Königinnen: ca. 5 - 6mm; Arbeiterinnen: ca. 3,5 - 5mm; Männchen: ca. 4 - 4,5mm;
Koloniegröße	meist bis 500, maximal 1000 Individuen
Luftfeuchtigkeit Arena/Nest	Arena: 30 - 50% Nestbereich: 50 - 70%
Temperatur Arena/Nest	Arena: 18 - 28°C Nestbereich: 21- 24°C
Bodengrund Arena	Farm: Sand-Lehm, Humus, Holz Arena: Sand, Sand-Lehm, Humus, Holz
Nestformen	Erdnester, unter Steinen
Entwicklungszeiten	vom Ei zur Arbeiterin ca. 6 Wochen
Einschätzung der Haltungsschwierigkeit	einfach zu haltende Ameisenart
Sonstige Angaben	Die Art sticht bei Gefahr, was dem Brennen einer Brennessel entsprechen kann.