# Aphaenogaster senilis



*Aphaenogaster senilis* ist eine unglaublich schnelle und sehr aggressive Ameisenart, die sich hauptsächlich in der Dämmerung und in der Nacht zur Nahrungssuche außerhalb des Nests bewegt und deren Volksstärke zwischen 100 und 1000 Arbeiterinnen schwankt. Die Kolonien bleiben somit recht klein.

Artenverzeichnis

| | |
|---|---|
| Familie | Formicidae (Ameisen) |
| Unterfamilie | Myrmicinae (Knotenameisen) |
| Tribus | Stenammini (ehem. Pheidolini) |
| Gattung | Aphaenogaster Mayr, 1853 |
| Art | Aphaenogaster senilis Mayr, 1853 |
| Unterart | Aphaenogaster senilis disjuncta Santschi, 1933; Aphaenogaster senilis grata Santschi, 1933; Aphaenogaster senilis occidua Santschi, 1933; Aphaenogaster senilis senilis Mayr, 1853 |
| Lebensraum/Heimat | mediterrane Südeuropa - Erdnest unter Steinen |
| Königinnen | monogyn, claustral |
| Arbeiterinnenunterkasten | monomorph |
| Nahrung | Honigwasser und Insekten bsp. Paarflügler wie Fliegen,Mücken |
| Winterruhe | ja, von Ende November bis Februar bei ca. 15°C |
| Aussehen/Färbung | durchgehend schwarz gefärbt |
| Puppen | Nacktpuppen |
| Körpergröße | Arbeiterinnen: ca. 5,5 - 7 mm<br>Königin: ca. 6 - 8 mm |
| Koloniegröße | 100-1000 |
| Luftfeuchtigkeit Arena/Nest | Arena: 30 - 50% Nestbereich: 50 - 70% |
| Temperatur Arena/Nest | Arena: 18 - 28°C Nestbereich: 21- 24°C |
| Bodengrund Arena | waldähnlich mit Moos, Gräser und andere Pflanzen |
| Nestformen | Erdnester unter Steinen |
| Entwicklungszeiten | Ei zu Larve: 16-20 Tage Larve zu Puppe: 16-20 Tage Puppe zu Imago: ca. 20 Tage Insgesamt: ca. 52-60 Tage |