


Strongylognathus testaceus



Strongylognathus testaceus ist ein Sozialparasit bei Tetramorium caespitum. Die Königin dringt in ein T. caespitum-Nest ein, tötet die Wirtskönigin aber nicht! Stattdessen wird die Geschlechtstierproduktion des Wirtes pheromonal unterdrückt. Der Anteil von S. testaceus an der gesamten Nestpopulation ist oft kleiner



Artenverzeichnis

Familie	Formicidae (Ameisen)
Unterfamilie	Agroecomyrmecinae
Tribus	Crematogastrini (ehem. Tetramoriini)
Gattung	Strongylognathus

Art	Strongylognathus testaceus
Lebensraum/Heimat	Europa bis Westsibirien; trockene Standorten (bei T. caespitum)
Königinnen	Die Königin dringt in ein T. caespitum-Nest ein, tötet die Wirtskönigin aber nicht! Stattdessen wird die Geschlechtstierproduktion des Wirtes pheromonal unterdrückt. monogyn
Arbeiterinnenunterkasten	monomorph
Nahrung	werden von Wirtsameisen gefüttert
Winterruhe	Ja
Schwärmzeit	Ende Juni - Ende August
Aussehen/Färbung	Arbeiterinnen gelbbraun bis rotbraun; Königinnen und Männchen dunkler;
Puppen	Keine Angabe
Körpergröße	Arbeiterinnen: 2-3,6 mm; Königinnen: 3,5-3,8 mm; Männchen: 3,2-4 mm;
Koloniegröße	Die Nester der Wirtsart können einige tausend Individuen sein.
Luftfeuchtigkeit	-
Arena/Nest	-
Temperatur Arena/Nest	-
Entwicklungszeiten	Entsprechend der Wirtsart.
Sonstige Angaben	stark gefährdet, von einer Entnahme aus der Natur sollte abgesehen werden.